

立大病媒驅除服務有限公司

LIH DAH PEST CONTROL SERVICE CO.,LTD.

000228

康橋國際學校

施 工 單

台照

填表日期

Order Date


地 址

Address

杏崗校區

客戶電話 Tel:

22165330

施 工 地 點 Location of Service	新店區.華城路800號		
施 工 日 期 Date of Service	110.5.14.		
施 工 分 類 Type of Service	☐ 蟑 螂 ☐ 跳蚤驅除 ☒ 綜合蟲害防治 ☐ 老鼠防治工程 ☐ 螞 蟻 ☐ 貨櫃燻蒸工程 ☐ 白蟻驅除工程 ☐ 一般消毒 ☐ 其 他		
施 工 範 圍 Areas to Be Treated	廚房及員工餐廳 上址室內全域		
施 工 費 用 Service Charge			
估 價 者	地址：新北市板橋區 三民路一段5巷13號2樓 電話：2956-3156		
施 工 者			
客 戶 簽 收	 5/14		備 註 Remarks

第一聯：(白)

第二聯：(黃)

第三聯：(紅)

第四聯：(綠)

3. 請將抽屜、櫥櫃打開，以增加防治效果。

預防中毒: 1. 工程進行中間雜人員禁止待在防治區域，防治工程後，至少兩小時後方可進

2. 防治工程進行完畢兩小時後，欲進入處理區域前，應先開啟門窗通風。

3. 工程進行前，請將食物、食器等日常用品允予覆蓋或移出防治區外。

4. 工程進行前請將寵物、家畜(禽)、鳥類等移出；水族箱須加蓋，打氣暫停。

中毒症狀: 過度敏感、流涕、昏睡、呼吸困難、疲倦、運動失調、精神呆滯……等。

解毒方法: 1. 若中毒症狀已出現則須盡速送醫，依症狀處理，目前尚無已知之解毒劑。

2. 當藥劑接觸到皮膚時，要立即用大量清水沖洗局部並盡速送醫治療。

急救方法: 緊急狀況下，可洽詢台北榮民總醫院之『臨床毒藥防治諮詢中心』

(02) 2781-7121、(02) 2875-7524、(02) 2875-7525

病媒防治施工證明書

日期: 110年 5月 14日

客戶名稱: 康橋國際學校 李南校區	病媒防治業名稱: 立 大病媒驅除股份有限公司	公司 簽章 	負責人簽章 
地址: 新店區華威路800號	地址: 220 新北市板橋區 三民路一段5巷13號2樓		技術人員簽章 
客戶代表簽章:	電話號碼: (02)2956-3156		
客戶編號:	傳真號碼: (02)2957-8814		
施工序號: 5330	許可證號碼: 環 藥病媒字號01-023號		
施工地點: 同上		施工日期: 110年 5月 14日 17時30分	
施工範圍描述:		施工面積:	
防治對象: ☒ 蟑螂 ☐ 老鼠 ☐ 跳蚤 ☒ 蚊子 ☒ 蒼蠅 ☐ 白蟻 ☐ 其他 _____			
施工次數: ☒ 一次施工 ☐ 定時保養 每月 1 次 每季 次 每半年 次			
施用藥劑品名及主成分濃度	稀釋後濃度	劑型	許可證字號
☐ 益年勇液劑 Termites Killer 12%	0.06%	乳劑	環署衛製字第 2002 號
☒ 得斯本 Chlorpyrifos 40.8%	0.255%	乳劑	環署衛製字第 1014 號
☒ 立滅寧液劑 Lemclim 20%	0.025%	乳劑	環署衛製字第 1685 號
☐ 中西全菊乳劑 d-Tetramethrin 0.75%	0.01875%	乳劑	環署衛製字第 0993 號
☒ 撲滅殺蟲 d-T80-Cyphenothrin 0.3%		乳劑	環署衛製字第 1021 號
使用區域: 蟑螂藏匿處 空間及縫隙 排水系統			
施工方法: 1. 建物環境: ☒ 鋼筋 ☐ 木造 ☐ 裝潢 2. 調查方式: ☐ 捕蟲燈 ☐ 捕蟲器 ☒ 現場檢查 ☐ 物品破壞 ☐ 足跡版 3. 驅除作業方式: ☒ 乳劑噴灑 ☐ 超低容量噴灑 ☐ 毒餌誘殺 ☐ 捕鼠板佈置 ☐ 化糞池處理 ☒ 電器系統處理 ☐ 燻蒸處理 4. 防治使用器材: ☐ 手壓式噴霧器 ☒ 動力式噴霧器 ☐ U.L.V機 ☐ 凝膠槍 5. 評估防治成果: ☐ 很滿意 ☐ 滿意 ☐ 尚可 ☐ 不滿意 ☐ 很差			
施藥劑前後應注意事項: 1. 防治工程之進行應配合貴司停止作業時段, 此時段至少要有三個小時。 2. 防治工程進行前, 電器電源, 瓦斯要關閉或熄滅。 3. 請將抽屜、櫥櫃打開, 以增加防治效果。			
預防中毒: 1. 工程進行中間雜人員禁止待在防治區域, 防治工程後, 至少兩小時後方可進/ 2. 防治工程進行完畢兩小時後, 欲進入處理區域前, 應先開啟門窗通風。 3. 工程進行前, 請將食物、食器等日常用品允予覆蓋或移出防治區外。 4. 工程進行前請將寵物、家畜(禽)、鳥類等移出; 水族箱須加蓋, 打氣暫停。			
中毒症狀: 過度敏感、流涕、昏睡、呼吸困難、疲倦、運動失調、精神呆滯……等。			
解毒方法: 1. 若中毒症狀已出現則須盡速送醫, 依症狀處理, 目前尚無已知之解毒劑。 2. 當藥劑接觸到皮膚時, 要立即用大量清水沖洗局部並盡速送醫治療。			
急救方法: 緊急狀況下, 可洽詢台北榮民總醫院之『臨床毒藥防治諮詢中心』 (02) 2781-7121、(02) 2875-7524、(02) 2875-7525			